



ØKO-UNGTYRE AF MALKEKVÆGRACE - FODRING



I dette fakta-ark kan du læse om nogle generelle forudsætninger for at opnå en god fodring af øko-ungtyre af malke race. Få inspiration til fodringen og læs hvad du skal være særlig opmærksom på.

Fodringen skal være billig

- Anvend så vidt muligt hjemmeavlet foder.
- Har du malkekvæg på ejendommen, kan du med fordel anvende eget grovfoder, fuldfoder og korn
- Hvis grovfoder indkøbes, skal det være billigt og rationelt.
- Typisk økologisk grovfoder vil være kløvergræsensilage, byg/ærte-helsædsensilage og ribbehøstet korn
- Roer kan også indgå.
- Grøntpiller, roepiller og lucernepiller kan medregnes i opgørelsen af grovfoderandelen, hvis du ikke har tilstrækkeligt med grovfoder.
- Kraftfodermidler vil typisk omfatte valset korn af havre byg og rug – evt. crimpet.
- Har kløver og græs for lavt proteinindhold, kan der anvendes hestebønner, ærter eller rapskage.

Fodring fra fødsel til fravæning

- Anvend sødmælk fra egen besætning de første 3 måneder af kalvens liv, hvis det er muligt. Gerne 2 x 4 liter pr. dag i 0-2 mdr. alderen.
- Tilbyd fra fødslen kalvekraftfoder med min. 18 % råprotein og godt høg med foderværdi på ca. 1,2 til 1,3 kg TS/FEN.
- Lav gradvis tilvæning til grovfoder/kofuldfoder (til lakterende køer). F.eks. fra 2 mdr. alderen med nedsat mælketildeling.
- Kalvene bør fordoble deres egen vægt fra 0 til 2 mdr. og veje 100 kg, gerne 120 kg, ved fravæning.
- Vej eller mål dine kalve ved fødsel og fravæning, og sæt ved fødsel mål for tilvæksten, f.eks. gå efter 800 g/dag.



For kalve i mælkefodringsperioden med fri adgang til grovfoder, er der ikke krav om grovfoderandel. Derefter skal de fodres med mindst 60 % grovfoder pr. dyr pr. dag hele sæsonen.

Fodring fra fravæning til 6 mdr.

- Overgangsperioden fra mælk til fast foder (3-6 mdr.) er særdeles vigtig for at sikre at kalven ikke 'tabes'.
- Sørg for godt med energi og nok protein i rationen til de mindste tyrekalve. Mangler der protein vil tilvæksten blive markant forringet. Sørg for mindst 17 % råprotein i den daglige ration.
- Energirigt grovfoder kan være ensilage lavet af 1. slæt (taget midt i maj).



- Ribbehøstet korn og majsensilage kan også indgå som grovfoder til disse kalve.
- Tilstræb en tilvækst på ca. 900 g/dag i denne periode for tyrekalve af stor race og krydsning, så kalvene vejer ca. 175 kg ved 6 mdr.

Fodring fra 6 til 10 mdr.

- Sørg for adgang til letfordøjeligt grovfoder med lav fylde i vinterration og tilskudsfoder.
- Sørg for godt og rigeligt græsudbud i hele afgræsningsperioden.
- Tyrene bør kunne vokse ca. 1000 g/dag i dette aldersinterval.

Fodring fra 10 mdr. til slagtning

- Ungtyre kan slagtes direkte fra græs - men det er svært uanset race og alder (12-18 mdr.) at opnå en passende fedningsgrad uden at tilskudsfodre.
- Det anbefales at tildele hvad der svarer til 40 % af dagsrationen i form af en højenergigirig blanding.
- Det kan være valset korn evt. blandet med kraftfoderpiller/rapskage/hestebønner, hvis andelen af græs ikke kan sikre et passende proteinniveau.
- Sats på denne slutfodring i min 3 mdr. forud for slagtning.
- Er tyrene på stald i de sidste måneder, kan der fodres med en god kofuldfoder og tilbydes wrap /græsensilage
- Lav din huldvurdering og vægtmåling, så du sikrer flest mulige slagtedy, som får den højeste afregning.

Suppleringsfodring under afgræsning

- Til de mindste kalve anbefales fortsat at udfodre en vis andel af dagsrationen som suppleringsfoder. Det kan f.eks. være kofuldfoder to gange dagligt. Der kan med fordel blandes ekstra valset korn i foderet. Husk også at tildele mineraler når tyrene er på græs.
- Dette kan i de fleste tilfælde gøres ved at tilbyde en god Type 3 mineralblanding.



Anvend så vidt muligt hjemmeavlet foder for at holde omkostningerne nede.

Faktaarket er udarbejdet i regi af projektet "Øget produktion af øko-ungtyre af malkekvægsrace", der har fået tilskud fra Fonden for økologisk landbrug.

LÆS MERE OM HOLD AF ØKOLOGISKE UNGTYRE AF MALKERACE PÅ

FRILANDSDYR.DK/FORMIDLING-KVAEG/